

Kondylombehandlinger 2001 - 2014


Opgørelsesmetode

Antallet af unikke personer der årligt er blevet behandlet for kondylomer, er opgjort ved at identificere fællesmængden af:

1. Afsluttede eller uafsluttede kontakter til private eller offentlige behandlingstilbud, som er registreret med følgende ICD-10 koder: DA630 (Veneriske vorter i anogenitalregionen), DA630B (Urethrale condylomer), DA630C (genitale condylomer) and DA630D (anale condylomer).
2. Personer der har indløst en recept på midler med følgende ATC koder: D06BB04 Podophyllotoxin og D06BB12 Sinecatechins.


Der kan være en mindre underrapportering af behandlinger, da behandling med det aktive stof Imiquimod (ATC kode: D06BB10) ikke er medtaget, da dette stof også benyttes til behandling af visse kræftformer og dette er den hyppigste indikation.

Antal personer (15 – 29 år), behandlet for kondylomer, per 1000 i denne aldersgruppe. 2001 - 2014




Kilde: Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut

Antal personer (30 – 39 år), behandlet for kondylomer, per 1000 i denne aldersgruppe. 2001 - 2014



Kilde: Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut

Antal personer (40 – 49 år), behandlet for kondylomer, per 1000 i denne aldersgruppe. 2001 - 2014



Kilde: Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut