

Radon i danske boliger

Kortlægning af lands-, amts- og kommuneværdier

Claus E. Andersen¹

Kaare Ulbak²

Anders Damkjær¹

Peter Gravesen³

¹Forskningscenter Risø

²Statens Institut for Strålehygiejne

³Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

Uddrag fra bilag J

Amts- og kommuneresultater for Københavns Amt
med tilhørende kommuner

Sundhedsstyrelsen

Statens Institut for Strålehygiejne

Januar 2001

J Datablade

Dette bilag indeholder undersøgelsens hovedresultater for enfamiliehuse i kommuner og amter. Databladene er placeret amtsvis. Der skelnes i databladene mellem rå målinger og vurderinger. De sidstnævnte beror på den statistiske kommunemodell, som beskrevet i afsnit 3.3 og Bilag H. I det følgende gives en kort forklaring af de enkelt dele af databladene (se desuden side 18).

Figur Øverst på databladet er der vist en figur over kommunevurderingerne. Hvert punkt angiver andelen (i procent) af huse i den enkelte kommune, som har radonniveauer over 200 Bq/m^3 (f_{200}). Kommunerne er ordnet efter stigende andel. For at have et sammenligningsgrundlag er amts- og landsværdierne også vist. Vurderingerne er behæftet med usikkerhed. Dette er indikeret grafisk vha. såkaldte usikkerhedsintervaller. Disse svarer til 68 % konfidensintervaller.

Kommunenavn Denne søjle angiver kommunenavnet.

Antal enfamiliehuse Antallet af enfamiliehuse iht. boligoptællingen pr. 1. januar 1994.

Forekomst sand & grus Dette er en forenklet geologisk beskrivelse af kommunens overfladenære jordlag (se side 9). Der skelnes her kun mellem grupperne "sand og grus" og "ler eller andre jordarter". Tabellen angiver hvilken del af kommunens overfladeareal, der er domineret af sand og grus. Hvis værdien er 10 %, betyder det normalt, at 90 % af arealet er overvejende moræneler. Andelen af sand-og-grus anvendes i kommunemodellen (se figuren side 107).

Antal huse (målinger) Denne søjle angiver hvor mange enfamiliehuse, der blev undersøgt i kommunen.

Middel (målinger) Denne søjle angiver den geometriske middelværdi (GM) for radonmålingerne i kommunen.

Max (målinger) Dette er den maksimalt målte radonkoncentration i kommunen.

f_{200} (målinger) Dette er den observerede andel af huse i kommunen, der har værdier over 200 Bq/m^3 . Hvis eksempelvis et enkelt hus havde en værdi over 200 Bq/m^3 , og hvis der blev gjort i alt 10 målinger i kommunen, da er f_{200} angivet til 10.0 %.

f_{400} (målinger) Dette er den observerede andel af huse i kommunen, der har værdier over 400 Bq/m^3 .

f_{200} (vurderinger) Under anvendelse af den statistiske kommunemodell er der foretaget en vurdering af hvor stor en andel af kommunens enfamiliehuse, der har radonkoncentrationer over 200 Bq/m^3 . Denne vurdering er angivet her. Vurderingerne er behæftet med usikkerhed, og 68 % konfidensintervaller er angivet i kantede parenteser.

f_{400} (vurderinger) Som ovenstående blot for 400 Bq/m^3 .

Klasse (vurderinger) På baggrund af f_{200} -vurderingen er kommunerne inddelt i klasser (se side 16):

Klasse 0 : 0–0.3 % (særlig lille tæthed af huse med niveauer over 200 Bq/m^3)


Klasse 1 : 0.3–1 % (lille tæthed af huse med niveauer over 200 Bq/m^3)

Klasse 2 : 1–3 %

Klasse 3 : 3–10 %

Klasse 4 : 10–30 % (stor tæthed af huse med niveauer over 200 Bq/m^3)

Landsdækkende undersøgelse af radon i Danmark
Hovedresultater for enfamiliehuse i **Københavns Amt**



Kommunenavn	Antal enfamilie- huse	Forekomst sand & grus %	Målinger				Vurderinger (model)				Klas- se	
			Antal huse	Middel Bq/m ³	Max Bq/m ³	<i>f</i> ₂₀₀ %	<i>f</i> ₄₀₀ %	<i>f</i> ₂₀₀ %	<i>f</i> ₄₀₀ %			
Gladsaxe	12799	60	13	29	150	0.0	0.0	0.3	[0.0, 1.1]	0.00	[0.00, 0.02]	1
Lyngby-Taarbæk	10959	40	13	41	100	0.0	0.0	1.0	[0.1, 1.9]	0.02	[0.00, 0.08]	1
Søllerød	8114	50	15	44	160	0.0	0.0	1.1	[0.3, 1.9]	0.03	[0.00, 0.08]	2
Herlev	6600	2	12	46	100	0.0	0.0	1.8	[0.1, 3.6]	0.05	[0.00, 0.22]	2
Tårnby	8474	50	15	55	240	6.7	0.0	2.2	[0.9, 3.4]	0.07	[0.00, 0.12]	2
Ishøj	3629	5	14	49	250	7.1	0.0	2.3	[0.6, 4.1]	0.07	[0.00, 0.26]	2
Vallensbæk	3204	20	11	51	250	18.2	0.0	2.5	[0.6, 4.4]	0.07	[0.00, 0.24]	2
Gentofte	12537	10	12	53	250	8.3	0.0	2.5	[0.5, 4.5]	0.08	[0.00, 0.27]	2
Dragør	3879	75	13	62	390	7.7	0.0	2.6	[1.3, 3.8]	0.08	[0.02, 0.14]	2
Ballerup	8946	10	13	53	200	0.0	0.0	2.7	[0.8, 4.6]	0.09	[0.00, 0.28]	2
Værløse	5397	40	15	60	170	0.0	0.0	2.9	[1.3, 4.5]	0.11	[0.01, 0.19]	2
Ledøje-Smørum	3240	40	14	62	210	7.1	0.0	3.3	[1.5, 5.0]	0.12	[0.02, 0.22]	3
Rødovre	7690	1	14	59	270	7.1	0.0	3.8	[1.4, 6.1]	0.15	[0.00, 0.43]	3
Albertslund	6822	1	10	63	100	0.0	0.0	3.9	[1.0, 6.7]	0.14	[0.00, 0.48]	3
Hvidovre	9761	25	12	66	220	8.3	0.0	3.9	[1.6, 6.2]	0.15	[0.00, 0.36]	3
Glostrup	3767	1	12	66	340	8.3	0.0	4.9	[1.8, 7.8]	0.21	[0.00, 0.59]	3
Brøndby	5167	5	11	87	340	27.3	0.0	8.5	[4.3, 13]	0.50	[0.09, 0.89]	3
Høje-Taastrup	9860	25	10	102	220	10.0	0.0	9.9	[6.0, 14]	0.63	[0.25, 1.00]	3
Amtsværdi (vægtet)	130845	-	229	54	390	5.4	0.0	3.2	[2.6, 3.8]	0.14	[0.08, 0.19]	3
Landsværdi (vægtet)	1412456	-	3019	58	590	4.6	0.4	3.9	[3.6, 4.2]	0.21	[0.18, 0.24]	3

Middel = Geometrisk middelværdi (GM)