



Kræft i øjne og orbita – modernærkekræft i uvea

Oversigt over indgang til pakkeforløb – til brug i almen praksis

Mistanke om kræft

Symptomerne på modernærkekræft i øjet er ikke specifikke. Det er bl.a. nedsat syn, synsfeltsdefekt og synsforvrængning. Disse symptomer skyldes langt hyppigst andre sygdomme.

Filterfunktion – hos praktiserende speciallæge eller øjenafdeling med hovedfunktion

Ved ovenstående symptomer undersøges patienten hos praktiserende speciallæge i øjensygdomme eller på øjenafdeling med hovedfunktion.

Begrundet mistanke – kriterier for henvisning til pakkeforløb

Begrundet mistanke om modernærkekræft i uvea opstår hos praktiserende speciallæge i øjensygdomme eller øjenafdeling med hovedfunktion ved:

- Nethindeløsning uden observerede huller eller traktion
- Oftalmoskopisk og eller ultralydsverificeret tumor i fundus
- Skygge i øjenvæggen ved gennemlysning

Henvisning til pakkeforløb

Ved begrundet mistanke om modernærkekræft i uvea skal patienten henvises til øjenafdeling med højt specialiseret funktion.

Det bør fremgå af henvisningen, at der er begrundet mistanke om modernærkekræft i uvea. Det skal af henvisningen tydeligt fremgå, hvilke af ovenstående symptomer eller fund der udløser den begrundede mistanke om modernærkekræft i uvea.

Kommunikation

Den henvisende læge drøfter følgende med patienten og evt. pårørende:

- Tilbud om henvisning til pakkeforløb med henblik på undersøgelse for modernærkekræft i uvea
- Næste trin i undersøgelsen
- Hvor og hvornår undersøgelsen vil ske

Patienten skal efter samtalen give samtykke til videre udredning i pakkeforløb.

Incidens og prævalens

Modernærkekræft i uvea forekommer hos 1 ud af 100.000 personer årligt, således at der er cirka 50 nye tilfælde per år i Danmark.

Risikogrupper

Mennesker med lys hudfarve har en højere risiko for modernærkekræft i uvea end mennesker med mørk hudfarve. Der er en øget risiko for modernærkekræft i uvea hos personer med dysplastisk nævus syndrom og personer med oculodermal melanose.

Link til pakkeforløbet for kræft i øjne og orbita

[https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kræft/pakkeforloeb/~media/3B4592D818424A53921F956F2A4FC664.ashx](https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kræft/pakkeforloeb/~/media/3B4592D818424A53921F956F2A4FC664.ashx)