



## Høringsnotat

### Den Nationale Rekommandationsliste – baggrundsnotat for impetigo

IRF i Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et baggrundsnotat for topikal behandling af impetigo hos børn og voksne i almen praksis. Baggrundsnotatet er del af Den Nationale Rekommandationsliste.

Baggrundsnotatet for impetigo har været i bred offentlig høring i perioden 31. maj 2017 til 28. juni 2017.

IRF i Sundhedsstyrelsen har modtaget seks høringssvar fra nedenstående parter listet i vilkårlig rækkefølge:

1. LEO Pharma
2. Region Hovedstaden
3. Region Sjælland
4. Region Midtjylland
5. Dansk Selskab for Almen Medicin
6. Dansk Pædiatrisk Selskab

Det er positivt, at regioner, faglige selskaber og andre har gennemgået og prioriteret at afgive høringssvar til baggrundsnotatet.

Dette notat opsummerer hovedlinjerne i høringssvarene og de afledte konsekvensændringer i baggrundsnotatet. Der er derudover foretaget mindre justeringer som følge af de indkomne bemærkninger.

En høringsspart bemærker, at fusidin ikke har særlig effekt på gruppe A-streptokokker. Det præciseres i baggrundsnotatet, at en podning kan være afgørende i behandlingen, hvorfor rekommandationerne i baggrundsnotatet ikke nødvendigvis er gældende for patienter, hvor dette resultat forelægger. I baggrundsnotatet er det anført, at det anbefales, at der foretages en podning ved første konsultation med patienten for at afgøre resistens og følsomhed til eventuel senere behandling med antibiotika.

Af en høringspart foreslås det, at forholdsregler for smitte beskrives. Det anføres, at det kan lette det pres, der kan være fra forældre og institutioner, om at udskrive antibiotika, uden at der foreligger en reel indikation. I baggrundsnotatet henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme hos børn og unge fra 2013. I den forbindelse fremhæves det, at mindre børn først kan komme i institution, når sårene er tørret ind, og sårskorperne er faldet af. Det præciseres således, at sårene fortsat kan smitte, selvom behandlingen er iværksat. Det tilføjes herudover, at børn i skolealderen kan komme i skole og institution, hvis sårene ikke er meget udbredte, og sårene kan dækkes til.