

SUNDHEDSSTYRELSENS INFORMATION

Fåresyge

Læs denne vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på fåresyge.

Fåresyge (parotitis epidemica) er en børnesygdom forårsaget af virus, som giver betændelse i spytkirtlerne.

Vaccination mod fåresyge indgår i børnevaccinationsprogrammet. Sygdommen er blevet sjælden pga. MFR-vaccination.

► Om smitte

Smitten spredes via hænder eller genstande, der er forurenet med spyt, eller dråber, som hostes eller nyses ud i luften.

Smitteperiode: fra 5 dage efter smitteudsættelse til 5 dage efter sygdommens begyndelse.

► Symptomer

Inkubationstid: 2-3 uger.

Fåresyge viser sig typisk ved let feber, hævelse og ømhed foran øret. Symptomerne svinder oftest inden for 1 uge.

► Behandling

Der er ingen behandling for sygdommen.

► Om forholdsregler ved sygdomstilfælde

Embedslægeinstitutionen har ansvaret for at iværksætte foranstaltninger ved tilfælde af fåresyge.

► Komplikationer

Hos drenge efter puberteten kan der opstå smertefuld betændelse i testiklerne. En anden komplikation til fåresyge er en form for hjernehindebetændelse, som almindeligvis er ufarlig, men dog kræver indlæggelse på sygehus.

► Komme i institution

Tidligst 6 dage efter sygdommens begyndelse.