

SUNDHEDSSTYRELSENS INFORMATION

Bylder

Læs denne vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på bylder.

Bylder (folliculitis og furuncles) er en lokaliseret betændelse i hud, oftest forårsaget af stafylokokker.

► Om smitte

Smitte overføres med væske fra bylden (pus) via hænder eller genstande. Spredning til andre ses især inden for husstanden.

Smitstoffer (fx stafylokokker) kan overleve i miljøet, fx i møbler, sengetøj eller på legetøj meget længe (måneder).

Smitteperiode: Fra bylden begynder at væske og til, bylden er tørret ind.

► Om forebyggelse

Korrekt håndhygiejne og en god rengøringsstandard er vigtig for forebyggelsen af smittespredning.

Væske fra børnesår eller bylder er fyldt med bakterier, og da små børn ikke har forståelse for renlighed og hele tiden vil berøre sårene, er det vigtigt at overholde reglerne for, hvornår børnene må komme – også selv om børnene ikke er særlig syge.

► Symptomer

Inkubationstid: Få dage.

På et afgrænset område er der ømhed, rødme, hævelse og senere pusansamling. Ved større bylder kan der være utilpashed eller feber.

► Behandling

Bylder kræver normalt lægebehandling.

► Om forholdsregler ved sygdomstilfælde

Hvis der påvises MRSA (methicillin-resistente gule stafylokokker) i en prøve fra bylden gælder særlige regler.

► Komme i institution

Når byldeerne er tørret ind.