

Ентеробіоз (гострики)

Прочитайте цей інформаційний листок і повідомте персонал, якщо у вашої дитини з'явилися ознаки ентеробіозу. Гострики (що викликають ентеробіоз) — це дрібні глисти, які живуть у кишечнику. Вони виходять за його межі й відкладають яйця біля відхідника.

Зараження

Яйця є дуже живучі й можуть виживати в постільній білизні та пилу пару тижнів. Зараження відбувається, коли діти смочуть пальці після дряпання відхідника. Таким чином яйця потрапляють дітям до рота.

Період зараження

Дитина вважається зараженою в період, що починається через 2 тижні після зараження й триває до початку лікування.

Профілактика

Постійне миття рук після відвідування туалету й прання домашньої постільної білизни у випадку появи гостриків у родині можуть запобігти зараженню.

Симптоми

Інкубаційний період

Від 2 до 6 тижнів.

Єдиним симптомом є свербіж в області відхідника, у дівчаток, можливо, у промежині. Свербіж є найбільш вираженим уночі. Глистів можна легко побачити на випорожненнях, а після сну — на шкірі навколо відхідника. Глисти мають довжину близько 1 см, білі й схожі на нитки.

Лікування

Лікар може призначити ліки від гостриків. Лікувати слід одночасно всіх членів сім'ї. Одночасно з початком лікування слід випрати постільну й нижню білизну за температури не менше 60 °C. Також потрібно ретельно мити руки й коротко підстригати нігті. Не соромтеся використовувати щіточку для нігтів.

Дитячий заклад

Дитина може відвідувати дитячий заклад без обмежень.